

SCINTIGRAFIJA ŠTITNE ŽLEZDE (99mTC PERTEHNETAT)

Ispitivanje se zakazuje za

Procedura:

Ispitivanje štitne žlezde započinje ubrizgavanjem u venu radioaktivnog materijala koji se potom absorbuje u zaušnim i podviličnim žlezdama. Istog trenutka kada se da injekcija, počinje snimanje regiona glave i vrata sa prednje strane dok pacijent leži na leđima. Snimanje traje 30 minuta od ubrizgavanja radiofarmaka a nekoliko minuta pre kraja dobija se vitamin C podjezično.

Molimo Vas da nam, u cilju dobrog tumačenja rezultata, odgovorite na sledeća pitanja:

1. Da li postoji bolna osetljivost vrata
2. Da li ste na vratu napipali oteklinu -tvrdinu.....
3. Da li uzimate lekove, navedite koje.....
4. Da li u porodici ima bolesti žlezda.....
5. Da li je neko u Vašoj porodici oboleo od karcinoma? Ako je odgovor na prethodno pitanje da, o kom tipu karcinoma se radi.....
6. Imate li alergije, da li je utvrđeno na šta ste alergični.....
7. Da li ste bolovali od drugih bolesti (ako jeste upišite koje bolesti).....
8. Da li sada uzimate lekove (upišite koje lekove pijete).....
9. Da li je do sada obavljena ispitivanja štitne žlezde (ili biopsija).....

Ukoliko ste saglasni sa ispitivanjem i korišćenjem rezultata u naučne svrhe molimo Vas za potpis sa kontakt telefonom (ili adresom):

.....