



## Институт за онкологију и радиологију Србије

Пастерова 14, Београд, Србија  
+381 11 2067 100


[iors@ncrc.ac.rs](mailto:iors@ncrc.ac.rs) [www.ncrc.ac.rs](http://www.ncrc.ac.rs)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ  
Бр. 26-236  
21 SEP 2015 20  
БЕОГРАД, Пастерова

# ПРОЦЕДУРА ЗА БРИЈАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПОЉА И ХИГИЈЕНСКОГ БРИЈАЊА И ШИШАЊА

Ознака процедуре	П.ИСХ.15
Верзија	01
Датум усвајања	21.09.2015.
Аутори процедуре	Анђелка Ранковић, ВДН Сњежана Остојић, ВДН
Носилац процедуре	Др Драгана Јовићевић
Процедуру одобрио	Проф. др Радан Цодић



 <p><b>ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ</b></p>	Назив процедуре:  <b>Процедура за бријање оперативног поља и хигијенског бријања и шишања</b>		Ознака: <b>П.ИСХ.15</b>
	Датум: 21.09.2015.	Верзија: 01	Страна: 2 од 3

## 1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

Процедура дефинише начин на који се врши бријање оперативног поља и хигијенско бријање и шишање.

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије

Комисија за БИ = Комисија за заштиту од болничких инфекција

## 2. ПРЕДМЕТ

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију а везано за начин на који се врши бријање оперативног поља и хигијенско бријање и шишање у ИОРС.

## 3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Подручје примене су пацијенти са свих одељења ИОРС.

## 4. ОДГОВОРНОСТИ


За спровођење процедуре одговорни су брица , све медицинске сестре у ИОРС и

Комисија за БИ

## 5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ

### Бријање оперативног поља

- Бријање оперативног поља обавља берберин или у његовом одсуству медицинска сестра.
- Берберин или медицинска сестра добија од Главне сетре Службе/Одељења/Одсека писмени налог са детаљним описом оперативног поља.
- Након добијеног писменог налога, започиње послове бријања.
- Прибор за бријање (бријач, маказе, чешаљ) пере се и дезинфикује дезинфекционим средством према упутству произвођача пре и после употребе.

 <p><b>ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ</b></p>	Назив процедуре:		Ознака: <b>П.ИСХ.15</b>
	<p><b>Процедура за бријање оперативног поља и хигијенског бријања и шишања</b></p>		
	Датум: 21.09.2015.	Верзија: 01	Страна: 3 од 3

Током бријања примењују се мере предострожности:

- Рад са заштитним рукавицама уз добро осветљење
- Употреба дезинфикованог прибора или прибора за једнократну употребу
- Дуже длаке се најпре ошишају маказама
- Бријање обавити 5-10цм шире од операционог поља, водећи рачуна да се не оштети кожа
- Користити сапун за бријање или пену за бријање, претходно проверити да ли пацијент има алергијску реакцију
- Обријано место опрати (пацијент да се окупа) и заштитити стерилном газом

### **Хигијенско бријање и шишање**

- Берберин по позиву Главне сестре Службе/Одељења/ Одсека обавља хигијенско бријање и шишање, у болесничкој соби или у просторији бербернице.
- Прибор за бријање (бријач, маказе, чешаљ) пере се и дезинфикује дезинфекционим средством према упутству произвођача пре и после употребе.

Током хигијенског бријања и шишања примењују се мере предострожности :

- Рад са заштитним рукавицама уз добро осветљење
- Употреба дезинфикованог прибора или прибора за једнократну употребу
- Пре бријања дуже длаке се најпре ошишају маказама
- Користити сапун за бријање или пену за бријање, претходно проверити да ли пацијент има алергијску реакцију
- За шишање се користе дезинфиковане маказе или дезинфикована машиница

## **6. ДОКУМЕНТА**

- Правилник за контролу болничких инфекција
- Шуљагић, Болничке инфекције: Протокол о спречавању интрахоспиталних инфекција, Београд: ВМА